


INSTRUCCIONES

Rociador nasal de hidrocloreuro de naloxona, 4 mg

Tratamiento de emergencia para la sobredosis de opioides


Importante:

- Solo para uso nasal
- No pruebe el dispositivo rociador nasal antes de usarlo
- 1 dispositivo rociador nasal contiene 1 dosis del medicamento
- Cada dispositivo puede rociar solo 1 vez



Paso 1: **COMPRUEBE** en caso de sospecha de sobredosis

- **COMPRUEBE** si hay sospecha de sobredosis: la persona no despierta, tiene mucho sueño o no respira bien
 - Grite: “¡Despierta!”
 - Sacuda suavemente a la persona
 - Si la persona no está despierta, vaya al paso 2



PASO 2: **ADMINISTRE** la 1ª dosis en la nariz

- **SOSTENGA** el dispositivo de rociado nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo
- **INSERTE** la boquilla en cualquiera de las fosas nasales
- **PRESIONE** el émbolo firmemente para administrar la 1ª dosis
- 1 dispositivo rociador nasal contiene 1 dosis



Paso 3: **LLAME** al 911

- **LLAME al 911** inmediatamente después de administrar la 1ª dosis



Paso 4: **MONITOREE Y ADMINISTRE**

- **ESPERE** 2 a 3 minutos después de la 1ª dosis para que el medicamento haga efecto
- si la persona despierta: vaya al paso 5
- si la persona no despierta:
 - **SIGA ADMINISTRANDO** dosis cada 2 a 3 minutos hasta que la persona despierte
 - Es seguro administrar más dosis



Paso 5: **QUÉDESE**

- **QUÉDESE** en el lugar hasta que llegue la ambulancia, incluso si la persona despierta
- **ADMINISTRE** otra dosis si la persona vuelve a tener mucho sueño
- Es posible que deba administrar todas las dosis del paquete



En caso de emergencia por consumo de opioides, llame al 911. Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre el rociador nasal de hidrocloreuro de naloxona, comuníquese con Amneal Pharmaceuticals llamando al 1-877-835-5472.